

∞ Corrigé du brevet des collèges ∞
 Nouvelle Calédonie 11 décembre 2025

EXERCICE 1 : QCM

15 points

1. 935 est un multiple de 5 : il n'est pas premier
 $6 + 8 + 7 = 21$ et $1 + 2 = 3$: 687 est donc multiple de 3 : il n'est pas premier.
 Donc 719 est premier.
2. On peut compléter la figure (en bas à gauche) par un rectangle de longueur $7 - 2 = 5$ et de largeur 2, donc d'aire $5 \times 2 = 10$.
 L'aire de la figure est donc égale à $7 \times 5 - 10 = 35 - 10 = 25$ (cm²).
 On peut aussi le découper en un rectangle de 7 sur 3 et un carré de côté 2, soit $7 \times 3 + 2^2 = 21 + 4 = 25$ (cm²).
3. On a $f(x) = 3(x + 1) = 3x + 3$: c'est bien l'expression d'une fonction affine.
4. On a $v = \frac{d}{t}$ avec $d = 6980$ et $t = 9$, on obtient une vitesse moyenne de $\frac{6980}{9} \approx 775,55$ soit ≈ 800 en arrondissant à la centaine le plus proche.
5. Le nombre de filles est égal à $7360 \times \frac{60}{100} = 730 \times 0,6 = 438$ (filles)

EXERCICE 2 : Cerf-volant

20 points

1.

Méthode 1 : dans le triangle BCD la droite BE est la médiane, la hauteur, donc la médiatrice de [CD] et aussi la bissectrice de l'angle \widehat{B} . Le point B est donc équidistant de C et de D.

L'angle \widehat{BCD} mesure donc $2 \times 30 = 60^\circ$.

Le triangle a donc ses deux autres angles de mesure $\frac{180 - 60}{2} = \frac{120}{2} = 60$ et finalement le triangle BCD est un triangle équilatéral de côté 40.

— Ou on sait que les hauteurs d'un triangle équilatéral de côté a mesure $a \frac{\sqrt{3}}{2}$, soit

$$\text{ici } 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3};$$

— Sinon on applique le théorème de Pythagore dans le triangle BDE :

$$BD^2 = BE^2 + ED^2, \text{ d'où } BE^2 = BD^2 - ED^2 = 40^2 - 20^2 = 1600 - 400 = 1200.$$

Donc $BE = \sqrt{1200} = \sqrt{400 \times 3} = \sqrt{400} \times \sqrt{3} = 20\sqrt{3} \approx 34,64$, soit 34,6 cm au millimètre près.

Méthode 2 : après avoir démontré que le triangle BCD est un triangle équilatéral et donc que $BD = 40$, on utilise la définition du cosinus de l'angle \widehat{EBD}

$$\cos \widehat{EBD} = \frac{ED}{BD}, \text{ d'où } ED = BD \times \cos \widehat{EBD} = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}.$$

2. Dans le triangle SHT rectangle en H le théorème de Pythagore s'écrit :
 $SH^2 = ST^2 + TH^2$, d'où $TH^2 = SH^2 - ST^2 = 205^2 - 7,6^2 = 420,25 - 57,76 = 362,49$, donc
 $TH = \sqrt{362,49} \approx 19,04$, soit 19,0 (cm) au millimètre près.
 Il est conseillé de ne pas utiliser ce cerf-volant lorsque le vent dépasse 20 km/h. La météo annonce un vent ne dépassant pas 15 nœuds.
3. 15 nœuds correspondent à $15 \times 0,514 = 7,71$ (m/s), soit $3600 \times 7,71 = 27756$ (m/h) soit finalement 27,756 (km/h).
 Thomas ne peut donc faire voler son cerf-volant sans risque.

EXERCICE 3 Programmes de calcul**16 points**

On considère les programmes de calcul suivants :

1. a. On obtient $2 \mapsto 2 + 4 = 6 \mapsto 3 \times 6 = 18$.
 b. De même $2 \mapsto 2 \times 5 = 10 \mapsto 10 - 3 = 7 \mapsto 7 - 2 = 5$
2. Soit f la fonction associée au programme A, qui au nombre choisi x fait correspondre le résultat $f(x)$.
 a. En partant de x on obtient :
 $x \mapsto x + 4 \mapsto 3(x + 4) = f(x) = 3x + 12$
 b. Il faut résoudre l'équation $f(x) = 27$ soit $3x + 12 = 27$ d'où $3x = 15$ soit $3 \times x = 3 \times 5$ et enfin $x = 5$.
3. a. On a $g(x) = 5x - 3 - x = 4x - 3$.
 b. Il faut trouver l'antécédent par g de 2, donc résoudre l'équation :
 $g(x) = 2$ ou $4x - 3 = 2$; en ajoutant à chaque membre 3, on obtient $4x = 5$ et en multipliant chaque membre par $\frac{1}{4}$, $x = 5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.
 L'antécédent par g de 2 est le nombre $\frac{5}{4} = \frac{125}{100} = 1,25$.
4. Il faut résoudre l'équation $f(x) = g(x)$, soit
 $3x + 12 = 4x - 3$: en ajoutant à chaque membre $3 - 3x$, on obtient : $15 = x$.
 On peut vérifier : $f(15) = 45 + 12 = 57$ et $g(15) = 60 - 3 = 57$.

EXERCICE 4 : Jeu de hasard**13 points**

1. Il y a 5 billes bleues pour un total de $15 + 10 + 5 = 30$ billes.
 La probabilité est donc égale à $\frac{5}{30} = \frac{1 \times 5}{6 \times 5} = \frac{1}{6}$.
2. Amandine a 1 chance sur 6 de gagner, alors qu'Alexis n'en a que 1 sur 10. Amandine a plus de chance de gagner qu'Alexis.
3. 20 issues :
 (R; 0); (R; 1); (R; 2); (R; 3); (R; 4); (R; 5); (R; 6); (R; 7); (R; 8); (R; 9);
 (V; 1); (V; 2); (V; 3); (V; 4); (V; 5); (V; 6);
 (B; 1); (B; 2); (B; 3); (B; 4).

EXERCICE 5 : Géométrie**20 points**

1. Les angles \widehat{AEB} et \widehat{EDC} sont des angles correspondants de même mesure 110° , donc les droites (EB) et (DC) sont parallèles.
2. Les points A, B et C sont alignés, les points A, E et D sont alignés et les droites (EB) et (DC) sont parallèles : on a donc une configuration de Thalès : les mesures des côtés des triangles AEB et ADC sont proportionnelles : en particulier

$$\frac{AE}{AD} = \frac{EB}{DC} \text{ soit } \frac{6}{15} = \frac{4}{DC}.$$

$$\text{Comme } \frac{6}{15} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Donc } \frac{2}{5} = \frac{4}{DC} : \text{ on en déduit par proportionnalité que } DC = 10 \text{ (cm).}$$

3. Le rapport de proportionnalité des longueurs des côtés des triangles AEB et ADC est égale à $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$, donc le rapport de proportionnalité des longueurs des côtés des triangles ADC et AEB est égale à $\frac{5}{2} = 2,5$.

Comme le calcul de l'aire d'un triangle fait intervenir le produit de la mesure de deux longueurs, l'aire du triangle ADC est égale à celle du triangle AEB multipliée par

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} = 2,5^2 = 6,25.$$

$$\text{Donc } \mathcal{A}(\text{ADC}) = 11,3 \times 6,25 = 70,625 \approx 70,6 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

4. Construire cette figure en vraie grandeur sur l'annexe 1.


EXERCICE 6 : Scratch**(16 points)**

1. Script 1 : Figure C; Script 2 : Figure A; Script 3 : Figure B.
2. Voir l'annexe

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Annexe 1 - Exercice 5 : Questions 4.

Construire la figure en vraie grandeur



ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Annexe 2 - Exercice 6 : Questions 2.

